

TRACEFOL

SÓLIDO MICRONIZADO

Contenido de nutrientes

Hierro (Fe)	4,5%
Manganeso (Mn)	5,0%
Zinc (Zn)	7,5%
Azufre de sulfatos (S)	15,0%
Molibdeno (Mo)	0,1%
Materia orgánica (base seca)	48-50%
Cenizas (base seca)	51-53%
Humedad	2,66%

Tensión superficial: 57 dyc/cm pH: 6,3 pH óptimo de aplicación: 6-7

Reacción en el suelo: -10 (ácida) Conductividad eléctrica: 24,8 mS/cm

SENASA nro.: CUVE n°:

Origen: España Fecha de fabricación:

Vencimiento: 24 meses.

Generalidades del producto: **TRACEFOL®** aplicado durante la fase activa del crecimiento vegetativo, previene, controla y corrige los estados carenciales, debidos a una mala absorción de nutrientes o a desequilibrios nutricionales, a la vez que actúa como estimulante del desarrollo. **TRACEFOL®** es el suplemento excepcional a la fertilización básica, diseñado para ser utilizado a durante las fases de mayor demanda de micronutrientes, anticipándose a la manifestación de carencias.

Recomendaciones de uso:

Preparación: se recomienda utilizar equipos de protección personal y contar con hoja de seguridad, informando el valor de pH. Para su correcta aplicación se deben respetar las siguientes indicaciones.

- Agregar agua al tanque del pulverizador hasta la mitad de su capacidad.
- Encender el agitador.
- Medir la dosis indicada e incorporarla al tanque. La dosis podrá variar de acuerdo con la zona, suelo y cultivo.
- Complete con agua el resto del tanque.

Importante: Las dosis son orientativas, dado que dependen de las necesidades de cada cultivo y de un análisis de suelo para verificar las falencias de nutrientes. Utilizar en aplicaciones terrestres un volumen de agua de 100 a 150 litros por hectárea para cultivos extensivos, y en aplicaciones aéreas 15 a 40 litros por hectárea. El producto preparado no debe conservarse por más de 24 horas en el tanque del pulverizador.

Utilizar siempre agua limpia.

Para su correcta aplicación por fertiirrigación se deben respetar las siguientes indicaciones:

- Preparación de la solución madre: La disolución máxima aconsejada para preparar solución madre es del 25%. Agitar e incorporar al tanque fertilizador del equipo de riego.
- No dejar los envases abiertos.
- La solubilidad aumenta en función de la temperatura.

La conductividad eléctrica del agua de riego no debe superar los 2 mS/cm.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: **TRACEFOL®** puede aplicarse con equipos terrestres o con mochila, provistos con picos o pastillas para herbicidas (abanico plano). Usar volúmenes de aplicación entre 150 y 200 litros/ha. Trabajar con presiones de 2.8-3.5 bar (40-50 lb/pulg²). Cubrir uniformemente todo el follaje, evitando el escurrimiento.

Especificidad en cultivos y dosis recomendadas para pulverización foliar.

Cultivo	Dosis	Momento de aplicación
Frutales de carozo y pepita	150 – 250 g/hl	1ª Aplicación: Prefloración; luego repetir cada 7-14 días.
Cítricos		Aplicar durante crecimiento vegetativo, post cuaje, crecimiento de fruto o según necesidad.
Vid		Efectuar la 1º aplicación cuando los brotes tienen de 12 a 15 cm de largo; la 2º poco antes de la floración y la 3º cuando la uva comienza a pintar.
Hortícolas de fruto: tomate, pimiento, berenjena	100 -200 g /hl	Desde el inicio de la brotación; luego repetir cada 7-14 días.
Avena, Trigo y Cebada	1 - 2 kg/ha	1ª Aplicación: Estadios vegetativos; 2ª Aplicación: floración; 3ª Aplicación: llenado de granos
Soja, Arveja y Maní		Realizar no más de tres aplicaciones, una en estado vegetativo según se requiera, y en fase de R3 (fructificación) y R5 (comienzo llenado de grano).
Girasol		Realizar no más de tres aplicaciones, una en estado vegetativo según se requiera, una al fin de la iniciación floral y otra a principios de antesis.

Especificidad en cultivos y dosis recomendadas para fertiirrigación.

Cultivo	Dosis	Momento de aplicación
Frutales de pepita y carozo	3-6 kg/ha	Desde brotación, aplicar entre 2-3 veces.
Cítricos		Aplicar antes de la floración, caída de pétalos y en otoño. Repetir cada 20 a 30 días.
Olivo y vid		Aplicar desde brotación a envero. No realizar más de tres aplicaciones.
Hortícolas de fruto y raíz		Realizar 3 aplicaciones durante el ciclo del cultivo, preferentemente de forma temprana para promover la formación de raíces.

“LAS INDICACIONES DE LA ETIQUETA SON ORIENTATIVAS. SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DEL PROFESIONAL INGENIER@ AGRÓNOM@ RESPONSABLE”.

“SE DEBERÁ UTILIZAR CONJUNTAMENTE CON EL AGREGADO DE UN TENSIOACTIVO, DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL MISMO O CONJUNTAMENTE CON AGROQUÍMICOS”.

“ESTE PRODUCTO ES UN COMPLEMENTO Y NO UN SUSTITUTO DE LOS FERTILIZANTES DE APLICACIÓN COMÚN INCORPORADOS AL SUELO”.

“NO APLICAR EN HORAS DE CALOR O MÁXIMA INSOLACIÓN”.

Incompatibilidad: No mezclar con aceites. En los productos que contengan cobre y/o azufre, se aconseja precaución porque puede potenciar en exceso los efectos de estos elementos. Se recomienda efectuar una prueba previa de compatibilidad.

Condiciones de almacenamiento: Mantener el producto en su envase original cerrado, en un lugar seguro, fresco, seco y al resguardo de la luz solar, ubicado fuera del alcance de personas inexpertas y animales. No transportar ni almacenar con alimentos, plaguicidas y semillas. Evitar almacenar a temperaturas por encima de 35 °C.

Firma registrante: SKOG S.R.L - Dirección: Santiago del Estero 2035 Dto A - CABA - Email: mcammarota@skogbio.com